

GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
 OSJETLJIVE POVRŠINE (dijelovi uređaja, respiratora, površine, tipke uređaja osjetljivih na djelovanje alkohola)	 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deteržentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Ispranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktni kontakt sa kožom ili sluznicom.	• 1x dnevno, po potrebi češće ili rjeđe, prema procjeni.
 OSTALE POVRŠINE (podovi, stolovi, površine ormarića, prozorske daske)	 WIP' ANIOS EXCELL	Maramice spreme za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštovati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	
 ZIDOVİ (ukoliko su predviđeni za pranje, prozori)	 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-tne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	• 1x dnevno, po potrebi i češće, te nakon vidljivog zaprljanja/kontaminacije.
 PROSTOR – DEZINFKECIJA	 UREĐAJEM AEROSEPT 500, UZ PRIMJENU ASEPTANIOS AD -DEZINFICIJENA ZA RASPRŠIVANJE ZRAKOM	Uređajem AEROSEPT 500, uz primjenu ASEPTANIOS AD -dezinficijena za raspršivanje zrakom. Koristi se u prethodno očišćenim prostorima, u kojima nema ljudi u trenutku dezinfekcije prostora.	• Po potrebi, u slučaju boravka bolesnika koji je koloniziran višestrukootpornim bakterijama, te u slučaju dospijevanja bioškog sadržaja na pod.
			• 1-2 x mjesečno.
			• U slučaju prskanja bioškog materijala.
			• U slučajevima pojave i širenja multirezistentnih bakterija, <i>C. difficile</i> , Norovirusa, i nakon otpusta/ smrti bolesnika koji su bili kolonizirani/inficirani navedenim patogenima.

Priredile: prof. dr. sc. Ivana Mareković, prof. dr. sc. Ana Budimir, doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Klinički bolnički centar Zagreb, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

* Ako se u ustanovi nalazi korisnik s *Clostridium difficile* koji je sporogena bakterija, alkoholni preparati za utrijavanje, odnosno higijensku dezinfekciju ruku ne djeluju jer ne uništavaju spore. Zato u svakoj indikaciji za higijenu ruku, ruke, bile vidljivo kontaminirane ili ne, treba oprati tekućim sapunom i vodom.

** Po preporuci proizvođača

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za uporabu proizvoda.

datum sastavljanja: svibanj 2018.



PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prlaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000, Faks: + 385 1 37 20 111
www.pliva.hr, www.plivamed.net, www.pliva-sept.hr



Pavé du Moulin - 59260 Lille - Hellennes -FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 05 27 48
www.anios.com



Prijedlog korištenja ANIOS dezinficijensa na odjelima niskog rizika



GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA	GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
	 ANIOSAFE SD HF	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium difficile</i> .*	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • prije kontakta s bolesnikom • prije aseptičnih postupaka • nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama • nakon kontakta s bolesnikom • nakon kontakta s okolinom bolesnika 		 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na radne površine, ostaviti da djeluje min 30 s. Isprati.	• Nekoliko puta dnevno, ovisno o učestalosti primjene u slučaju direktnе kontaminacije - ODMAH
	 ANIOSGEL 800	Higijensko utrijavaњe (3 - 5 ml / 30 s).	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • prije kontakta s bolesnikom • prije aseptičnih postupaka • nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama • nakon kontakta s bolesnikom • nakon kontakta s okolinom bolesnika 		 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-tne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	• Više puta dnevno
	 ANIOSAFE SD HF	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium difficile</i> *	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • uvijek kad izgledaju prljavo • prije jela • pri korištenju sanitarnog čvora • prije stavljanja kontaktnih leća • prije uzimanja lijekova • nakon dodira s izlučevinama (slina, iscjedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj) 		 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterdžentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Ispranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktan kontakt sa kožom ili sluznicom.	• Više puta dnevno
	 ANIOSGEL 800	Higijensko utrijavaњe (3 - 5 ml / 30 s)	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • prije kontakta s bolesnikom • prije aseptičnih postupaka • nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama • nakon kontakta s bolesnikom • nakon kontakta s okolinom bolesnika 		 WIP' ANIOS EXCELL	Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	• Više puta dnevno.
	 ANIOSAFE SD HF	Nanelite losion na vlažnu kožu i vlasiste i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrijajte sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • Pranje, kupanje i njega kože osoba osjetljivih na sapune (starje i nepokretne osobe). 		 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-tne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine ne dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	• Više puta dnevno.
	 DERMANIOS SCRUB CHX 4%	Nanelite antiseptik na vlažnu kožu i vlasiste i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrijajte sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • Dekolonizacija MRSA korisnika 		 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene radne površine, ostaviti da djeluje minimalno 30 sekundi. Isprati.	• Više puta dnevno.
	 ANIOS QUICK WIPES	Maramice za dezinfekciju - Maramice spremne za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Primijeniti na cijelo područje koje treba dezinficirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Nije potrebno ispirati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktan kontakt s kožom ili sluznicom. Ponoviti nanošenje kad god je to potrebno ili se pridržavati važećeg plana dezinfekcije. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • Nakon upotrebe 		 ANIOXY-SPRAY WS	Proizvod spremen za uporabu-Raspršiti sredstvo izravno po površini koju je potrebno tretirati ili na čistu i suhu netkanu krpnu. Krpnu istrijaliti površinu. Ostaviti da djeluje potrebno kontaktno vrijeme. Isprati ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• Više puta dnevno
	 ANIOSEPT ACTIV	Pripremiti 1% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 50 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 30 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu. U slučaju da se radi o korisniku s <i>Clostridium difficile</i> infekcijom potrebno je ponoviti postupak koristeći novu 2% radnu otopinu. Pripremiti 2% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 100 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 15 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • Nakon upotrebe 		 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterdžentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Ispranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktan kontakt sa kožom ili sluznicom.	• Nakon upotrebe