



GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
 RADNE POVRŠINE (stol za pregled, kolica, hodalice)	 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterdžentni dezinficijens dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktnog vremena ostaviti da se osuši. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktan kontakt sa kožom ili sluznicom.	Nakon upotrebe
	 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene radne površine otporne na alkohol, ostaviti da djeluje 30 s. Isprati.	
 OSJETLJIVE POVRŠINE (dijelovi uređaja, respiratora, površine, tipke uređaja osjetljivih na djelovanje alkohola)	 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterdžentni dezinficijens dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktnog vremena ostaviti da se osuši. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktan kontakt sa kožom ili sluznicom.	1 x dnevno, po potrebi češće ili rjeđe, prema procjeni.
	 WIP' ANIOS EXCELL	Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir sa kožom, sluznicom ili hranom.	
 OSTALE POVRŠINE (podovi, stolovi, površine ormarića, prozorske daske)	 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-tne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati. (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	1 x dnevno, po potrebi i češće, te nakon vidljivog zaprljanja/kontaminacije.
	 ANIOS OXY'FLOOR	Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezinficijensa u prahu). Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	Po potrebi, u slučaju boravka bolesnika koji je koloniziran višestruko otpornim bakterijama, te u slučaju dospijevanja biološkog sadržaja na pod.
 ZIDOVI (ukoliko su predviđeni za pranje, prozori)	 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-tne otopine: uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati. (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	1 - 2 x mjesečno.
	 ANIOS OXY'FLOOR	Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezinficijensa u prahu). Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	U slučaju prskanja biološkog materijala.
 PROSTOR - DEZINFEKCIJA	 UREĐAJEM AEROSEPT 500, UZ PRIMJENU ASEPTANIOS AD -DEZINFICIJENSA ZA RASPRŠIVANJE ZRAKOM	Uređajem AEROSEPT 500, uz primjenu ASEPTANIOS AD - dezinficijensa za raspršivanje zrakom. Koristi se u prethodno očišćenim prostorima, u kojima nema ljudi u trenutku dezinfekcije prostora.	U slučajevima pojave i širenja multirezistentnih bakterija, <i>C. difficile</i>, Norovirusa, i nakon otpusta/ smrti bolesnika koji su bili kolonizirani/inficirani navedenim patogenima.

Priredile: prof. dr. sc. Ivana Mareković, prof. dr. sc. Ana Budimir, doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Klinički bolnički centar Zagreb, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

* Ako se u ustanovi nalazi korisnik s *Clostridium difficile* koji je sporogena bakterija, alkoholni preparati za utrljavanje, odnosno higijensku dezinfekciju ruku ne djeluju jer ne uništavaju spore. Zato u svakoj indikaciji za higijenu ruku, ruke, bile vidljivo kontaminirane ili ne, treba oprati tekućim sapunom i vodom.

** Po preporuci proizvođača

Prijedlog korištenja ANIOS dezinficijensa na odjelima visokog rizika



PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000, Faks: + 385 1 37 20 111
www.pliva.hr, www.plivamed.net, www.pliva-sept.hr




Pavé du Moulin - 59260 Lille - Hellemmes - FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 05 27 48
www.anios.com

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za uporabu proizvoda.

datum sastavljanja: svibanj 2018.



GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
 RUKE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA	 ANIOSAFE SD HF  DERMANIOS SCRUB CHX 4%**	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium difficile</i>.* Kad se ruke peru vodom i tekućim sapunom, sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 30-60 sekundi.	Uvijek: - prije kontakta s bolesnikom - prije aseptičnih postupaka - nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama - nakon kontakta s bolesnikom - nakon kontakta s okolinom bolesnika
 RUKE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA	 ANIOSGEL 800  ANIOSRUB 800	Higijensko utrljavanje (3 - 5ml / 30 s). Pri uporabi alkoholnog preparata za utrljavanje, uliti 3-5 ml preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obiju šaka. Trljati ruke preporučenim pokretima dok ruke ne budu suhe, u vremenu od 30 sekundi.	Uvijek: - prije kontakta s bolesnikom - prije aseptičnih postupaka - nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama - nakon kontakta s bolesnikom - nakon kontakta s okolinom bolesnika
 RUKE BOLESNIKA	 ANIOSAFE SD HF  DERMANIOS SCRUB CHX 4%**	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium difficile</i>.* Kad se ruke peru vodom i tekućim sapunom, sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 30-60 sekundi.	- uvijek kad izgledaju prljavo - prije jela - pri korištenju sanitarnog čvora - prije stavljanja kontaktnih leća - prije uzimanja lijekova - nakon dodira s izlučevinama (slina, iscjedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj)
 RUKE BOLESNIKA	 ANIOSGEL 800  ANIOSRUB 800	Higijensko utrljavanje (3 - 5 ml / 30 s) Pri uporabi alkoholnog preparata za utrljavanje, uliti 3-5 ml preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obiju šaka. Trljati ruke preporučenim pokretima dok ruke ne budu suhe, u vremenu od 30 sekundi.	- uvijek kad izgledaju prljavo - prije jela - pri korištenju sanitarnog čvora - prije stavljanja kontaktnih leća - prije uzimanja lijekova - nakon dodira s izlučevinama (slina, iscjedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj)
 KOŽA BOLESNIKA	 ANIOSAFE SD HF	Nanesite losion na vlažnu kožu i vlasište i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrljajte sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	Pranje, kupanje i njega kože osoba osjetljivih na sapune (starije i nepokretne osobe).
	 DERMANIOS SCRUB CHX 4%	Nanesite antiseptik na vlažnu kožu i vlasište i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrljajte sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	Dekolonizacija MRSA korisnika.
 OPREMA ZA DIJAGNOSTIKU (stetoskop, tlakomjer s manžetom za odrasle i djecu, neurološki čekić, svjetiljka za pregled pupile, glukometar)	 ANIOS QUICK WIPES	Maramice za dezinfekciju - Maramice spremne za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Primijeniti na cijelo područje koje treba dezinficirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Nije potrebno ispirati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktan kontakt s kožom ili sluznicom. Ponoviti nanošenje kad god je to potrebno ili se pridržavati važećeg plana dezinfekcije. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja.	Nakon upotrebe.
 PRIBOR I INSTRUMENTI (prije sterilizacije)	 ANIOSEPT ACTIV	Pripremiti 1% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 50 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 30 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu. U slučaju da se radi o korisniku s <i>Clostridium difficile</i> infekcijom potrebno je ponoviti postupak koristeći novu 2% radnu otopinu . Pripremiti 2% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 100 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 15 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu.	Nakon upotrebe.

GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
 ENDOSKOPI	 ANIOS'CLEAN EXCEL D  ANIOSYME XL3	Čišćenje prije dezinfekcije – Potpuno uroniti medicinski uređaj i četkati kanale. Dobro isprati unutarnje i vanjske dijelove vodom vodom. Obrisati čistim ručnikom. Aniosyme XL3 – 0,5% koncentracija (25 mL u 5 litara hladne ili mlake vode); vrijeme namakanja ovisno o mikroorganizmima na koje se cilja. Ili Anios'Clean Excel D – 0,5% koncentracija; vrijeme namakanja ovisno o mikroorganizmima na koje se cilja	Nakon upotrebe
 ČESTO DOTICANE POVRŠINE (u blizini bolesnika, u krugu dohvata bolesnikovih ruku u krugu neposrednog dohvata osoblja koje njeguje/ pregledava bolesnika, kvake, telefonske slušalice, tipkovnice, prekidač)	 OPASTER'ANIOS	Dezinfekcija - Otopina spremna za upotrebu; kontaktno vrijeme 5 minuta osim kod C. difficile 30 minuta; stabilnost radne otopine 14 dana; ispravnost otopine provjeravati testnim trakama. Isprati i osušiti prema protokolu.	Nekoliko puta dnevno, ovisno o učestalosti primjene u slučaju direktne kontaminacije - ODMAH
	 ANIOXYDE 1000	Dezinfekcija - Aktivirati otopinu; kontaktno vrijeme 5 minuta; stabilnost radne otopine 14 dana; ispravnost otopine provjeravati testnim trakama. Isprati i osušiti prema protokolu.	
 ČESTO DOTICANE OSJETLJIVE POVRŠINE (touch screen ekrani i slično, površine od plexiglasa)	 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene radne površine, ostaviti da djeluje min 30 s. Isprati.	Više puta dnevno
	 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-tne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	
 ČESTO DOTICANE OSJETLJIVE POVRŠINE (touch screen ekrani i slično, površine od plexiglasa)	 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjenu, s raspršivačem. Nanesite deterdžentni dezinficijens dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktnog vremena ostaviti da se osuši. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktan kontakt sa kožom ili sluznicom.	Više puta dnevno
	 WIP' ANIOS EXCELL	Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	
 SVE ČESTO DOTICANE POVRŠINE U OKOLINI BOLESNIKA ZA KOGA JE POZNATO DA JE KOLONIZIRAN VIŠESTRUKO OTPORNIM BAKTERIJAMA	 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-tne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	Više puta dnevno
	 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene radne površine, ostaviti da djeluje min 30 s. Isprati.	
 PREDMETI I POVRŠINE U OKOLINI BOLESNIKA KOLONIZIRANOG S C. DIFFICILE	 ANIOS QUICK WIPES	Maramice za dezinfekciju - Maramice spremne za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Nije potrebno ispirati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktan kontakt s kožom ili sluznicom.	Više puta dnevno
	 ANIOXY-SPRAY WS	Proizvod spreman za uporabu-Raspršiti sredstvo izravno po površini koju je potrebno tretirati ili na čistu i suhu netkanu krpu. Krpom istrljati površinu. Ostaviti da djeluje potrebno kontaktno vrijeme. Isprati ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt s kožom i sluznicom.	